

编码：YPSW202600312

2026年国家医保药品目录调整
申报材料（公示版）



中国医疗保障

CHINA HEALTHCARE SECURITY

药品名称：利奈唑胺氯化钠注射液

企业名称：石家庄四药有限公司

申报信息

申报时间	2026-06-09 17:25:04	药品目录	药品目录外
------	---------------------	------	-------

一、基本信息

药品申报条件：

- 1.2021年1月1日（含，下同）至2026年6月10日期间，经国家药监部门批准上市或已完成技术审评的新通用名药品，仅因转产、再注册等单纯更改通用名的药品除外。
- 2.2021年1月1日至2026年6月10日期间，经国家药监部门批准或已完成技术审评，适应症或功能主治发生重大变化，且针对此次变更获得药品批准证明文件的药品。
- 3.2020年1月1日后国家药监部门附条件批准上市且于2023年1月1日至2026年5月31日期间转为常规批准的新通用名药品（不含新适应症或功能主治）。
- 4.2026年6月10日前经国家药监部门批准上市或已完成技术审评，纳入现行版《国家基本药物目录》的药品。
- 5.纳入《商业健康保险创新药品目录》（2025年）的药品。
- 6.2026年6月10日前经国家药监部门批准上市或已完成技术审评，纳入国家卫生健康委等部门《首批鼓励研发申报儿童药品清单》《第二批鼓励研发申报儿童药品清单》《第三批鼓励研发申报儿童药品清单》《第四批鼓励研发申报儿童药品清单》《第五批鼓励研发申报儿童药品清单》以及《第一批鼓励仿制药品目录》《第二批鼓励仿制药品目录》《第三批鼓励仿制药品目录》《第四批鼓励仿制药品目录》的药品。
- 7.2026年6月10日前经国家药监部门批准上市或已完成技术审评，说明书适应症或功能主治中包含有国家卫生健康委《第一批罕见病目录》《第二批罕见病目录》所收录罕见病的药品。
- 8.2020年1月1日以后谈判准入的品种，因未能成功续约而被调出目录的，首个同通用名药品于2021年1月1日至2026年5月31日期间获批上市的，但原谈判企业品种不能申报。

药品通用名称（中文、含剂型）	利奈唑胺氯化钠注射液	商品名	无
医保药品分类与代码	XJ01XXL411B002010102763	是否为独家	否
申报目录类别	基本医保目录		
药品类别	西药		
① 药品注册分类	化学药品第3类		
核心专利类型1	一种利奈唑胺降解杂质的合成方法	核心专利权期限届满日1	2040-08
核心专利类型2	利奈唑胺中潜在基因毒性杂质的检测方法	核心专利权期限届满日2	2042-03
核心专利类型3	一种注射用水的制备方法	核心专利权期限届满日3	2042-09
核心专利类型1	一种利奈唑胺降解杂质的合成方法	核心专利权期限届满日1	2040-08
核心专利类型2	利奈唑胺中潜在基因毒性杂质的检测方法	核心专利权期限届满日2	2042-03
核心专利类型3	一种注射用水的制备方法	核心专利权期限届满日3	2042-09
当前是否存在专利纠纷	否		
说明书全部注册规格	300ml:利奈唑胺0.6g与氯化钠2.7g		
上市许可持有人（授权企业）	石家庄四药有限公司		
说明书全部适应症/功能主治	本品用于治疗由特定微生物敏感株引起的下列感染：院内获得性肺炎，由金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感和耐药的菌株）或肺炎链球菌引起的院内获得性肺炎。社区获得性肺炎，由肺炎链球菌引起的社区获得性肺炎，包括伴发的菌血症，或由金黄色葡萄球菌（仅为甲氧西林敏感的菌株）引起的社区获得性肺炎。复杂性皮肤和皮肤软组织感染，包括未并发骨髓炎的糖尿病足部感染，由金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感和耐药的菌株）、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和皮肤软组织感染。尚无利奈唑胺用于治疗褥疮的研究。非复杂性皮肤和皮肤软组织感染，由金黄色葡萄球菌（仅为甲氧西林敏感的菌株）或化脓性链球菌引起的非复杂性皮肤和皮肤软组织感染。万古霉素耐药的屎肠球菌感		

染，包括伴发的菌血症。为减少细菌耐药的发生，确保利奈唑胺及其他抗菌药物的疗效，利奈唑胺应仅用于治疗已确诊或高度怀疑敏感菌所致感染。如可获得细菌培养和药物敏感性结果，应当考虑据此选择或调整抗菌治疗。如缺乏这些数据，当地的流行病学资料和药物敏感性状况可能有助于经验性治疗的选择。在对照临床研究中，对于应用利奈唑胺制剂超过28天的安全性和有效性尚未进行评价。利奈唑胺不适用于治疗革兰阴性菌感染。如确诊或疑似合并革兰阴性菌感染，立即开始针对性的抗革兰阴性菌治疗十分重要（见【注意事项】）。

说明书用法用量

利奈唑胺推荐剂量 感染*院内获得性肺炎、社区获得性肺炎（包括伴发的菌血症）、复杂性皮肤和皮肤软组织感染，儿童患者†(出生至11岁)，每8小时10 mg/kg 静注或口服‡，建议疗程(连续治疗天数)10 - 14天；成人和青少年(12岁及以上)：每12小时600 mg 静注或口服‡，建议疗程(连续治疗天数)10 - 14天。万古霉素耐药的屎肠球菌感染（包括伴发的菌血症），儿童患者†(出生至11岁)，每8小时10 mg/kg 静注或口服‡，建议疗程(连续治疗天数)14 - 28天；成人和青少年(12岁及以上)，每12小时600 mg 静注或口服‡，建议疗程(连续治疗天数)14 - 28天。非复杂性皮肤和皮肤软组织感染，儿童患者†(出生至11岁)，5岁以下每8小时10 mg/kg口服‡，5-11岁每12小时10 mg/kg 口服，建议疗程(连续治疗天数)10 - 14天；成人和青少年(12岁及以上)，成人每12小时口服400 mg‡，青少年每12小时口服600 mg‡，建议疗程(连续治疗天数)10 - 14天。*指由特定病原体引起的感染（参见【适应症】） †未滿7天的新生儿：大多数出生未滿7天的早产儿(孕龄未滿34孕周)对利奈唑胺的系统清除率较足月儿和其他大婴儿低，且AUC值更大。这些新生儿的初始剂量应为10 mg/kg每12小时给药，当临床效果不佳时，应考虑按剂量10 mg/kg每8小时给药。所有出生7天或以上的新生儿应按10 mg/kg每8小时的剂量给药（参见【药代动力学】、【儿童用药】）。‡口服剂量指利奈唑胺片剂或利奈唑胺口服混悬剂。MRSA感染的成年患者应采用利奈唑胺600mg每12小时一次进行治疗。在有限的临床经验中，6例儿童患者中的5例（83%），利奈唑胺对其感染的革兰阳性病原体的最低抑菌浓度为4µg/ml，经利奈唑胺治疗后临床痊愈。然而，与成人相比，儿童患者的利奈唑胺清除率和全身药物暴露量（AUC）的变化范围更宽。当儿童患者的临床疗效未达到最佳时，尤其是对于利奈唑胺最低抑菌浓度为4µg/ml的病原体，在做疗效评估时应考虑其较低的全身暴露药量、感染部位及其严重程度以及其基础疾病（见【药代动力学】和【儿童用药】）。在对照临床研究中，研究方案所设定的治疗所有感染的疗程均为7至28天。总的疗程由治疗医生根据感染部位和严重程度及病人对治疗的反应而制定。当从静脉给药转换成口服给药时无需调整剂量。对起始治疗时应用利奈唑胺氯化钠注射液的患者，医生可根据临床状况，予以利奈唑胺片剂或口服混悬液继续治疗。静脉给药 利奈唑胺氯化钠静脉注射剂为单次使用的多层共挤膜输液用袋。静脉给药时，应在使用前目测微粒物质。检查是否有细微渗漏。鉴于无菌状况可能受损害，若发现有渗漏应丢弃溶液。利奈唑胺氯化钠静脉注射剂应在30至120分钟内静脉输注完毕。不能将此静脉输液制剂串联在其它静脉给药通路中。不可在此溶液中加入其它药物。如果利奈唑胺氯化钠静脉注射剂需与其它药物合并应用，应根据每种药物的推荐剂量和给药途径分别应用。尤其应注意，利奈唑胺氯化钠静脉注射剂与下列药物通过Y型接口联合给药时，可导致物理性质不配伍。这些药物包括：二性霉素B、盐酸氯丙嗪、安定、喷他咪异硫代硫酸盐、红霉素乳糖酸酯、苯妥英钠和甲氧苄啶-磺胺甲异噁唑。此外，利奈唑胺氯化钠静脉注射液与头孢曲松钠合用可致二者的化学性质不配伍。如果同一静脉通路用于几个药物依次给药，在应用利奈唑胺氯化钠静脉注射液前及使用后，应使用与利奈唑胺氯化钠静脉注射剂和其它药物可配伍的溶液进行冲洗（见可配伍静脉注射液）。可配伍的静脉注射液 5%葡萄糖注射液，0.9%氯化钠注射液，乳酸林格氏液。在使用时方可拆除输液袋的外包装袋。在室温下贮藏，避免冷冻。

所治疗疾病基本情况

患病率高：耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌（MRSA）病原体成为全世界医院和社区感染的主要原因，患病率为15%-75%。危害大：革兰氏阳性MRSA作为耐药菌之一已导致全球死亡率上升并引起各种致命感染，研究表明MRSA感染会延长住院时间、增加住院费用、增加患病率及死亡率。

是否已获批上市

是，已获得注册批件

中国大陆首次上市时间

2023-10

注册证号/批准文号

国药准字H20234267

该通用名全球首个上市国家/地区

英国

该通用名全球首次上市时间

2015-04

是否为OTC

否

同疾病治疗领域内或同药理作用 药品上市情况

1.注射用盐酸万古霉素于2010年4月在中国上市，2024年版医保目录乙类品种，限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症。 2.利奈唑胺氯化钠注射液与注射用盐酸万古霉素相比优势在于：①疗效显著：利奈唑胺显著缩短抗生素治疗持续时间（ $P<0.0001$ ），显著提高出院率（ $P<0.05$ ）。②安全性高：肾毒性发生率低， ≥ 65 岁老年人、肝肾功能不全等特殊人群无需调整剂量。

企业承诺书

↓ 下载文件

企业承诺书.pdf

药品最新版法定说明书（**预申报药品请先上传提交至药监部门审批的说明书，并在规定时间内上传经药监部门审核的说明书**）

↓ 下载文件

利奈唑胺氯化钠注射液说明书.pdf

所有《药品注册证书》（国产药

品)或《进口药品注册证》(进口药品),包括首次上市的批准注册证明文件和历次《药品补充申请批准通知书》《药品再注册批准通知书》,请扫描成一个文件后上传

↓ 下载文件 利奈唑胺氯化钠注射液.pdf

申报药品摘要幻灯片(含价格费用信息)

↓ 下载文件 利奈唑胺氯化钠注射液PPT1.pptx

申报药品摘要幻灯片(不含价格费用信息)将要同其他信息一同向社会公示

↓ 下载文件 利奈唑胺氯化钠注射液PPT2.pptx

参照药品信息

说明:

- 1、参照药品原则上应为同治疗领域内临床应用最广泛的目录内药品,最终参照药品认定以专家评审意见为准。
- 2、中成药:一律填写日均费用。
- 3、西药:(1)慢性病用药,原则上计算日费用,如有治疗周期,标注治疗周期。
(2)急抢救、麻醉、检验等用药,请按一个治疗周期计算次均费用。
(3)肿瘤、罕见病用药原则上按365天用药计算年费用,如说明书中严格限定了治疗周期,可按治疗周期计算疗程费用,并予以说明。
(4)其它情况请按说明书用法用量计算费用,并详细说明。
(5)计算过程中如涉及以下指标,请统一按以下标准计算上述费用,如未按以下标准,请说明。
① 儿童:18周岁以下,体重20公斤,体表面积0.8m²。
② 成人:18周岁及以上,体重65公斤,体表面积1.68m²。

参照药品名称	是否医保目录内	规格	单价(元)	用法用量	费用类型	金额(元)	疗程/周期
利奈唑胺葡萄糖注射液	是	300ml:利奈唑胺600mg与葡萄糖13.7g(按C6H12O6计)	23.88	0.6g, 2次/日	日均费用	47.76	14天


参照药品选择理由: 目前目录内已包含利奈唑胺片和利奈唑胺葡萄糖注射液,其中利奈唑胺氯化钠注射液与利奈唑胺葡萄糖注射液均为注射剂型,具有可比性。

其他情况请说明: 无

二、有效性信息

试验类型1	单个样本量足够的RCT
试验对照药品	替考拉宁
试验阶段	上市后
对主要临床结局指标改善情况	临床主要指标改善情况: 针对G+感染重症监护患者: ①利奈唑胺耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)清除率显著优于替考拉宁(51.1% vs 18.6%, P = 0.002) ②利奈唑胺临床治愈率高于替考拉宁(78.9% vs 72.8%) ③利奈唑胺细菌清除率高于替考拉宁(70% vs 66.2%)
试验数据结果证明文件,外文资料须同时提供原文及中文翻译件(除英语之外的外文资料,中文翻译件须经专业翻译机构认证,以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性)	↓ 下载文件 临床试验1MRSA.pdf

试验类型2	单个样本量足够的RCT
试验对照药品	万古霉素
试验阶段	上市后
对主要临床结局指标改善情况	针对MRSA院内肺炎患者，利奈唑胺临床治愈率显著高于万古霉素（57.6% vs 46.6%，P = 0.042）。
试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）	↓ 下载文件 临床试验2ZEPHyRstudy肺炎.pdf
试验类型3	单个样本量足够的RCT
试验对照药品	万古霉素
试验阶段	上市后
对主要临床结局指标改善情况	针对复杂皮肤和软组织感染患者，利奈唑胺相比于万古霉素显著缩短抗生素治疗持续时间（P<0.0001），显著提高出院率（P<0.05）。
试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）	↓ 下载文件 临床试验3复杂皮肤软组织感染.pdf
试验类型4	单个样本量足够的RCT
试验对照药品	头孢羟氨苄
试验阶段	上市后
对主要临床结局指标改善情况	针对非复杂皮肤/皮肤结构感染的儿童患者，利奈唑胺有效治疗由金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌引起的儿童简单皮肤/皮肤结构感染，治愈率91%，金葡菌根除率89.6%。
试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）	↓ 下载文件 临床试验4儿童非复杂皮肤感染.pdf
试验类型5	单个样本量足够的RCT
试验对照药品	万古霉素
试验阶段	上市后
对主要临床结局指标改善情况	针对手术部位MRSA感染患者，利奈唑胺在临床治愈率（87% vs 48%）及治疗时间（4.7d vs 11.1d）方面优于万古霉素。
试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）	↓ 下载文件 临床试验5手术部位MRSA感染.pdf



中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

<p>(除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性)</p>	
<p>试验类型1</p>	<p>单个样本量足够的RCT</p>
<p>试验对照药品</p>	<p>替考拉宁</p>
<p>试验阶段</p>	<p>上市后</p>
<p>对主要临床结局指标改善情况</p>	<p>临床主要指标改善情况：针对G+感染重症监护患者：①利奈唑胺耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）清除率显著优于替考拉宁（51.1% vs 18.6%，P = 0.002） ②利奈唑胺临床治愈率高于替考拉宁（78.9% vs 72.8%） ③利奈唑胺细菌清除率高于替考拉宁（70% vs 66.2%）</p>
<p>试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 临床试验1MRSA.pdf</p>
<p>试验类型2</p>	<p>单个样本量足够的RCT</p>
<p>试验对照药品</p>	<p>万古霉素</p>
<p>试验阶段</p>	<p>上市后</p>
<p>对主要临床结局指标改善情况</p>	<p>针对MRSA院内肺炎患者，利奈唑胺临床治愈率显著高于万古霉素（57.6% vs 46.6%，P = 0.042）。</p>
<p>试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 临床试验2ZEPHyRstudy肺炎.pdf</p>
<p>试验类型3</p>	<p>单个样本量足够的RCT</p>
<p>试验对照药品</p>	<p>万古霉素</p>
<p>试验阶段</p>	<p>上市后</p>
<p>对主要临床结局指标改善情况</p>	<p>针对复杂皮肤和软组织感染患者，利奈唑胺相比于万古霉素显著缩短抗生素治疗持续时间（P<0.0001），显著提高出院率（P<0.05）。</p>
<p>试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 临床试验3复杂皮肤软组织感染.pdf</p>
<p>试验类型4</p>	<p>单个样本量足够的RCT</p>
<p>试验对照药品</p>	<p>头孢羟氨苄</p>
<p>试验阶段</p>	<p>上市后</p>

<p>对主要临床结局指标改善情况</p>	<p>针对非复杂皮肤/皮肤结构感染的儿童患者，利奈唑胺有效治疗由金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌引起的儿童简单皮肤/皮肤结构感染，治愈率91%，金葡菌根除率89.6%。</p>
<p>试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 临床试验4儿童非复杂皮肤感染.pdf</p>
<p>试验类型5</p>	<p>单个样本量足够的RCT</p>
<p>试验对照药品</p>	<p>万古霉素</p>
<p>试验阶段</p>	<p>上市后</p>
<p>对主要临床结局指标改善情况</p>	<p>针对手术部位MRSA感染患者，利奈唑胺在临床治愈率（87% vs 48%）及治疗时间（4.7d vs 11.1d）方面优于万古霉素。</p>
<p>试验数据结果证明文件，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 临床试验5手术部位MRSA感染.pdf</p>
<p>临床指南/诊疗规范推荐情况1</p>	<p>《中国腹腔感染诊治指南（2019版）》：结合MRSA致其他感染的治疗推荐，本指南制定专家组认为万古霉素或利奈唑胺可用于治疗MRSA所致IAI，对存在肾功能损伤风险的病人应优先考虑选用利奈唑胺。</p>
<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 1中国腹腔感染诊治指南2019版.pdf</p>
<p>临床指南/诊疗规范推荐情况2</p>	<p>《中国糖尿病足防治指南（2019版）（III）》：MRSA是最常见的耐药革兰阳性球菌，目前尚无对万古霉素、去甲万古霉素的耐药菌株，如存在肾功能减退可选择利奈唑胺。</p>
<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 2中国糖尿病足防治指南2019版III.pdf</p>
<p>临床指南/诊疗规范推荐情况3</p>	<p>《腹膜透析相关感染的防治指南》：链球菌和肠球菌：针对耐药菌，可与氨基糖苷类联合治疗，也可以选择新型抗耐药菌抗生素如利奈唑胺等。</p>
<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译</p>	<p>↓ 下载文件 3腹膜透析相关感染的防治指南.pdf</p>



件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）

临床指南/诊疗规范推荐情况4

《美国感染病学会治疗成人及儿童甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染临床实践指南》：复杂性cSSTI的抗生素治疗选用：万古霉素静脉滴注(A- I)；利奈唑胺600 mg每日2次口服或静脉滴注(A- I)。

临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）

↓ 下载文件

4美国感染病学会治疗成人及儿童甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染临床实践指南.pdf

临床指南/诊疗规范推荐情况5

《中国儿童肺炎链球菌性疾病诊断、治疗和预防专家共识（2020）》：对多重耐药的肺炎链球菌，可考虑使用万古霉素或替考拉宁或利奈唑胺。

临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）

↓ 下载文件

5中国儿童肺炎链球菌性疾病诊断治疗和预防专家共识.pdf



临床指南/诊疗规范推荐情况1

《中国腹腔感染诊治指南（2019版）》：结合MRSA致其他感染的治疗推荐，本指南制定专家组认为万古霉素或利奈唑胺可用于治疗MRSA所致IAI，对存在肾功能损伤风险的病人应优先考虑选用利奈唑胺。

临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）

↓ 下载文件

1中国腹腔感染诊治指南2019版.pdf

CHINA HEALTHCARE SECURITY

临床指南/诊疗规范推荐情况2

《中国糖尿病足防治指南（2019版）（III）》：MRSA是最常见的耐药革兰阳性球菌，目前尚无对万古霉素、去甲万古霉素的耐药菌株，如存在肾功能减退可选择利奈唑胺。

临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）

↓ 下载文件

2中国糖尿病足防治指南2019版III.pdf

临床指南/诊疗规范推荐情况3

《腹膜透析相关感染的防治指南》：链球菌和肠球菌：针对耐药菌，可与氨基糖苷类联合治疗，也可以选择新型抗耐药菌抗生素如利奈唑胺等。

<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 3腹膜透析相关感染的防治指南.pdf</p>
<p>临床指南/诊疗规范推荐情况4</p>	<p>《美国感染病学会治疗成人及儿童甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染临床实践指南》：复杂性cSSTI的抗生素治疗选用：万古霉素静脉滴注(A- I)；利奈唑胺600 mg每日2次口服或静脉滴注(A- I)。</p>
<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 4美国感染病学会治疗成人及儿童甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染临床实践指南.pdf</p>
<p>临床指南/诊疗规范推荐情况5</p>	<p>《中国儿童肺炎链球菌性疾病诊断、治疗和预防专家共识（2020）》：对多重耐药的肺炎链球菌，可考虑使用万古霉素或替考拉宁或利奈唑胺等。</p>
<p>临床指南/诊疗规范中需包含申报药品推荐情况具体内容，并突出（高亮）显示药品名称、适应症、推荐意见等关键信息，外文资料须同时提供原文及中文翻译件（除英语之外的外文资料，中文翻译件须经专业翻译机构认证，以保证涉外资料原件与翻译件的一致性、准确性和客观性）</p>	<p>↓ 下载文件 5中国儿童肺炎链球菌性疾病诊断治疗和预防专家共识.pdf</p>
<p>国家药监局药品审评中心《技术审评报告》中关于本药品有效性的描述</p>	<p>无</p>
<p>《技术审评报告》原文（可节选）</p>	<p>-</p>
<p>国家药监局药品审评中心《技术审评报告》中关于本药品有效性的描述</p>	<p>无</p>
<p>《技术审评报告》原文（可节选）</p>	<p>-</p>

三、安全性信息

<p>药品说明书记载的安全性信息</p>	<p>因为开展临床试验的条件各不相同，在某种药物的临床试验中观察到的不良反应率不能与另一种药物在临床试验中的不良反应率直接比较，并且可能无法反映在临床实践中观察到的不良反应率。成年患者在疗程最长28天的7个III期阳性药物对照临床研究中，入选了2046例患者以评价利奈唑胺的安全性。在治疗非复杂性皮肤和皮肤软组织感染(uSSSI)的患者中，25.4%的使用利奈唑胺的患者和19.6%的使用对照药物的患者至少出现一起与药物相关的不良事件。对于所有其它适应症，20.4%的使用利奈唑胺的患者和14.3%的使用对照药物的患者至少出现一起与药物相关的不良事件。在这些研究中，按不良事件的严重程度统计，85%的利奈唑胺不良事件为轻至中度。表2为发生率超过2%的不良事件。利奈唑胺最常</p>
----------------------	--

	见的不良事件为腹泻（不同研究中发生率为2.8%至11.0%），头痛（不同研究中发生率为0.5%至11.3%）和恶心（不同研究中发生率为3.4%至9.6%）。
药品不良反应监测情况和药品安全性研究结果	①利奈唑胺阳性药物对照的临床研究中，患者不良事件发生率不劣于其他阳性药物（头孢泊肟、头孢曲松、克拉霉素、双氯西林、苯唑西林、万古霉素）。发生率>5%的不良反应包括腹泻、头痛、恶心。②一项前瞻性、随机、阳性对照研究表明利奈唑胺治疗MRSA引起的院内肺炎，其肾毒性发生率明显低于万古霉素。
相关报导文献	↓ 下载文件 1临床试验2ZEPHyRstudy肺炎.pdf

四、创新性信息

创新程度	利奈唑胺氯化钠注射液为仿制药，注册分类为化药3类，开展了BE试验，结果表明，本品与原研参比制剂质量和疗效一致，具有可替代性。
创新性证明文件	-
应用创新	(1) 成分不含糖，满足糖尿病患者用药需求。(2) 成分含氯化钠，具有电解质调节作用，同时满足低钠血症、休克患者用药需求。
应用创新证明文件	-
传承性（仅中成药填写）	-
传承性证明文件	-

五（一）、公平性信息

所治疗疾病对公共健康的影响	耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌（MRSA）病原体成为全世界医院和社区感染的主要原因，患病率为15%-75%，且死亡率高。
符合“保基本”原则（仅涉及申请《基本医保目录》的药品填写）	利奈唑胺氯化钠注射液临床疗效确切、安全可控，契合医保保基本原则。
弥补目录短板	医保目录内尚无氯化钠溶媒的利奈唑胺注射剂，利奈唑胺氯化钠注射液可满足糖尿病、低钠血症等特殊人群用药需求，保障特殊人群医疗保障公平性。
临床管理难度	抗菌用药精准：抗菌谱、适应症明确，固定剂量给药，在临床指征明确或有培养和药敏信息的情况下，才考虑使用利奈唑胺，抗菌用药精准。特殊使用级管理：利奈唑胺纳入特殊使用级管理，处方审核严格，临床滥用风险小。